



ශ්‍රී ලංකා රතු ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ සාමාජික පරීක්ෂණය - 2021

5883

කාලය පිටුව 1

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔබ්බට (MCQ) ප්‍රශ්න 40 කින් සහ විචල්‍ය (V) 6 කින් සමන්විත වේ.

විභාග අවබෝධයකින් හඳුනා දිය යුතුය:

1. සියලුම ප්‍රශ්න හඳුනා විචල්‍යය සහතිකය යුතුය.
2. ඔබගේ ලකුණු දී ඇති ඔබ්බට (MCQ) විචල්‍යය පත්‍රයේ නිවැරදි විචල්‍යය පත්‍රයක් කැබැල්ලක් මගින් ලකුණු කළ යුතුය.

1. ප්‍රමාදයට යනු කුමක්ද?

- I. ප්‍රමාදයෙන් පෝෂිත විකේෂණ කිරීම.
- II. පෝෂිතයන් පෝෂණ ලක්ෂණ කිරීම.
- III. හදිසි අනතුරකදී හෝ පෝෂිතයන්ගේ වෛද්‍යාධාරණ සේවාවෙන්, ප්‍රමාදයට යුතුය දී අනෙකුත් විධිවිධාන අධාර.
- IV. පෝෂිතයන්ගේ තත්ත්වය කිරීම සහ පෝෂිතයන්ගේ නිවැරදි කිරීම.

2. ප්‍රමාදයට යනු කුමක්ද සමන්විත වේ.

- I. පෝෂිත විකේෂණ/ප්‍රතිකාරය/හදිසි
- II. පෝෂිත ලක්ෂණ කිරීම/හදිසි කිරීම/ප්‍රතිකාරය
- III. හදිසි අනතුරකදී හෝ පෝෂිතයන් කිරීම/හදිසි කිරීම/පෝෂිත ලක්ෂණ කිරීම
- IV. පෝෂිත ඉතිහාසය කිරීම/පෝෂිත ලක්ෂණ කිරීම/ප්‍රතිකාරය

3. ප්‍රමාදයට යනු කුමක්ද සමන්විත වේ.

- I. හදිසි ප්‍රදේශයකදී පිටින සේවාව හදිසිව කටයුතු කිරීම.
- II. හදිසි අනතුරකදී ලක්ෂණ අයුතු සහ ඒ අවට සිටින අයගේ සහ සමාජයේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වීම.
- III. පෝෂිතයන් හෝ අනතුරකදී ලක්ෂණ කෙරෙහි පිටින සේවාව හදිසිව කටයුතු කිරීම.
- IV. ඉහත සඳහන් සියල්ලම.

4. කොළඹ සහ දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල අය කිරීමෙන් පොරොන් ක්‍රියාත්මක වන සුවසේවය නිමැවීමට රට සේවයේ දුරකථන අංකය.

- I. 1901
- II. 1900
- III. 1990
- IV. 1910

5. ප්‍රමාදයට යනු DRSCAB වලින් හඳුන්වන්නේ

	D	R	S	C	A	B
I.	Danger අනතුර	Recue මුදාගැනීම	Symptoms රෝග ලක්ෂණ	Circulation රුධිර සංසරණය	Ambulance ගිලන් රථය	Breathing ශ්වසන පරීක්ෂාව
II.	Doctor වෛද්‍යවරයා	Recue මුදාගැනීම	Signs for Breathing ශ්වසනය කරන බවට සලකුණු	Compression පපු තෙරපුම	Ambulance ගිලන් රථය	Blood Pressure රුධිර පීඩන පරීක්ෂාව
III.	Danger අනතුර	Repond ප්‍රතිචාර	Send for help දුරව ඉල්ලන්න	Circulation රුධිර සංසරණය	Airway ශ්වසන මාර්ගය විවෘත කරන්න	Breathing ශ්වසන පරීක්ෂාව
IV.	Doctor වෛද්‍යවරයා	Recue මුදාගැනීම	SMS for help දුරව සඳහා කෙටි පණිවිඩයක් යැවීම	Circulation රුධිර සංසරණය	Airway ශ්වසන මාර්ගය විවෘත කරන්න	Breathing ශ්වසන පරීක්ෂාව

6. බිම වැටී සිටින කෙනෙකු හුස්ම ගන්නේ දැයි පරීක්ෂා කර බැලිය හැක්කේ,

- I. බඩ සහ පපුව උස් පහත් වන බව බැලීම.
- II. නාසය සහ මුඛය ලගට ඔබගේ කණ තබා හුස්ම ගන්නේ දැයි බැලීම.
- III. පපුව සහ බඩ ප්‍රදේශයට අත තබා එම ප්‍රදේශයන්හි සෙලවීමක් ඇත්දැයි බැලීම.
- IV. මෙම සියළුම කරුණු.

7. ඔබ ගමනක් යන විට පාරේ කෙසෙක් වැටී ඇත. ඔබ ඔහු වෙත ගොස් උසහිසට තට්ටු කර කතා කළත් ප්‍රතිචාර නොදක්වයි. ඔහු වමනය කර ඇති බවද පෙනේ. ඔහු හුස්ම නොගන්නා බවත් පෙනී යයි. උදව් ඉල්ලා ගිලන් රථයක් අමතන්න යැයි කෙනෙකුට පැවසීමෙන් පසු ඔබ කළ යුත්තේ,

- I. වහාම ඔහුගේ වමනය කට්ත් පියදැමීමට තැත් කිරීම.
- II. ඔහුව පැත්තකට හැරවීම.
- III. වහාම CPR පපු තෙරපුම පමණක් ලබාදීම.
- IV. ඔහුව කෙළින් අතට තබා කකුල් දෙක උස්කර තැබීම.

8. RICE ප්‍රතිකාරය ලබා දෙන්නේ,

- I. කෙනෙකු සිහිපුන්ව වැටී සිටින අවස්ථාවකදී.
- II. කෙනෙකුගේ පාදයක් උළක්කු වී ඇති අවස්ථාවකදී.
- III. යම්කිසි කෙනෙකුට යමක් හිරවී ඇති විට
- IV. ඉහත සඳහන් සියල්ලම අසත්‍ය වේ.

9. RICE ප්‍රතිකාරය යනු අනුපිළිවෙලින්,

- I. නිශ්චල කිරීම (විවේකිත තැබීම), අයිස් තැබීම, සෘජු පීඩනය, මදක් ඔසවා තැබීම.
- II. පතුරක් බැඳීම, සෘජු පීඩනය, පරියකින් වෙලීම, බීමට (Aspirin) පෙත්තක් ලබාදීම.
- III. වතුර බීමට ලබාදීම, බාම් ආලේප කිරීම, සෘජු පීඩනය, මදක් ඔසවා තැබීම.
- IV. පරියකින් වෙලීම, බාම් ආලේප කිරීම, වැරෙන් කකුල පිරිමැදීම, අයිස් තැබීම.

10. යම් කෙනෙකුට උගුරේ හිරවීමට (Chocking) හැකියාවක් ඇත්තේ,

- | | |
|----------------|--------------|
| I. වතුර | II. බත් |
| III. දියර කිරි | IV. පැණි බීම |

11. ඔබගේ මිතුරා සමග ආහාර ගනිමින් සිටින විට, ඔහු හදිසියේම උගුර අතින් අල්ලාගෙන මුහුණ රතු වී ඔබ දෙස බලා සිටියි. ඔහුගේ උගුරේ යමක් හිරවී ඇතැයි, ඔහු අතින් කියයි. ඔබ කළ යුත්තේ,

- I. ඔහුට බීමට වතුර ලබාදීම.
- II. ඔහුගේ මළුව පාත් කර පිටට තට්ටු කිරීම.
- III. ඔහුට නාසයෙන් හුස්ම ගන්නයි උපදෙස් දී, පිටට තට්ටු කිරීම.
- IV. ඔහුගේ පිටට පස් වතාවක් වැරෙන් පිටට තට්ටු කිරීම සහ ඔහුට පිටුපසින් පැමිණා බඩ ප්‍රදේශය තෙරපීම. (Abdominal Thrust)

12. කෙනෙකුට CPR දිය යුත්තේ,

- I. ක්ලාන්ත ගතියක් ඇතැයි රෝගියා විසින් පවතින අවස්ථාවකදී.
- II. රෝගියා බිම වැටී ඉතාමත් දුර්වල ලෙසට හුස්ම ගැනීමට අපහසු බව පවසන විට.
- III. රෝගියා සිහි නැවතී, නොසෙල්වී හුස්ම නොගෙන සිටින විට.
- IV. රෝගියා දරුණු ලෙසට පපුවේ රැදීමක් ඇති බව පවසන විට.

13. ලේ ගැලීමකදී ප්‍රථමයෙන් කළ යුත්තේ,

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| I. තුවාලය ගලා යන වතුරෙන් සේදීම. | II. තුවාලය මතට අයිස් තැබීම. |
| III. තුවාලය මතට පීඩනයක් යෙදීම. | IV. තුවාලය සේලයින් වලින් සේදීම. |

14. කෙනෙකුගේ කකුලේ විශාල වීදුරු කැබැල්ලක් ඇති ඇතුළට ගොස් ලේ ගලමින් ඇත.
ප්‍රථමාධාරකරුවෙකු වශයෙන් ඔබ පළමුවෙන්ම කළ යුතු දේ නම්,
 - I. එම වීදුරු කැබැල්ල ඇද දමා ලේ ගැලීම පාලනය කිරීම.
 - II. එම වීදුරු කැබැල්ල තිබියදී එය වටා පීඩනයක් (අතියම් පීඩනයක්) යොදා ලේ ගැලීම පාලනය කිරීම.
 - III. වහාම ඔහුව රෝහලකට ගෙන යාම සඳහා ආධාර ඉල්ලීම.
 - IV. II සහ III පියවර දෙකම ගැනීම.
15. යම්කිසි කෙනෙකුගේ ඇඟිල්ලක් කැපී වෙන්වී ඇත. එම කැපී වෙන්වී ඇති ඇඟිල්ල සඳහා කළ යුත්තේ,
 - I. විෂබීජ නැසූ (Sterile) ගෝස් කැබැල්ලකින් එය එහීම.
 - II. එය ප්ලාස්ටික් බෑග් එකකට දැමීම.
 - III. එම ප්ලාස්ටික් බෑග් එක අයිස් මත තබා තුවාලකරු සමග හැකි තරම් ඉක්මනින් රෝහලට ගෙන යාම.
 - IV. ඉහත සියල්ලම කළ යුතුයි.
16. ඇට බිඳුමකදී (Fracture) සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,
 - I. අධික වේදනාව.
 - II. ඉදිමුව
 - III. ඇට බිඳුමකදී ඇති වී තිබෙන අත හෝ කකුල ඇද වී තිබීම.
 - IV. අධික ලෙස දහඩිය පිටවීම.
17. ගොඩනැගිල්ලක ගින්නකට හසුවී කෙනෙක් බලවත් සේ පිළිස්සී ගොඩනැගිල්ල තුළ සිටින බව ඔබට දැන ගැනීමට ලැබේ. ප්‍රථමාධාරකරුවෙකු වශයෙන් ඔබ පළමුවෙන්ම අවධානය දිය යුත්තේ,
 - I. එම ස්ථානය ආරක්ෂිත ද බැලීම.
 - II. රෝගියාගේ නාභි පරීක්ෂා කිරීම.
 - III. රෝගියා හුස්ම ගන්නේ දැයි බැලීම.
 - IV. පිළිස්සුණු පෙදෙස සිසිල් කිරීම.
18. තුන්වන මට්ටම පිළිස්සීමේ රෝග ලක්ෂණ මොනවාද?
 - I. පිළිස්සුණු සම, වේදනාවක් නැත.
 - II. පිළිස්සුණු සම, වේදනාවක් ඇත.
 - III. දිය බිබිලි සහ වේදනාව
 - IV. රතු සම සහ වේදනාව නැත.
19. ඔබගේ සහෝදරයාගේ අත පිළිස්සී ඔහු වේදනාවෙන් කෑ ගසයි. ඔහුගේ අත වතුර කරාමයකට කොපමණ වේලාවක් අල්ලා තැබිය යුතුද?

I. මිනිත්තු 5 - 10 අතර	II. මිනිත්තු 20
III. මිනිත්තු 30	IV. වතුර ඇල්ලීම කළ යුතු නැත.
20. CPR දීමේදී පපු තෙරපුම කළ යුත්තේ,
 - I. පියයුරු අස්ථියේ පහළ භාගය.
 - II. තන පුඩු දෙක අතර පපුවේ මැද.
 - III. ඉල ඇටයට මඳක් පහළින්, ඉහල උදරය
 - IV. ඉල ඇටයට උඩින්, පපුවේ වම් පැත්ත.
21. වයස අවුරුදු 1 - 8 දරුවෙකුට CPR ලබා දිය යුත්තේ,
 - I. පපු තෙරපුම වාර 30 ශ්වසන වාර 2
 - II. පපු තෙරපුම වාර 30 ශ්වසන වාර 3
 - III. පපු තෙරපුම වාර 35 ශ්වසන වාර 2
 - IV. පපු තෙරපුම වාර 35 ශ්වසන වාර 1

22. රෝගියෙකුට CPR දීම නැවැත්විය හැක්කේ,
 - I. CPR දීම පටන් ගෙන මිනිත්තු 15 කට පසුව
 - II. හිලන් රටය පැමිණ Paramedic විසින් රෝගියා භාරගත්විට.
 - III. රෝගියා සාමාන්‍ය ආකාරයට හුස්ම ගන්නා විට.
 - IV. දෙක සහ තුන්වන අවස්ථාවලදී.
23. නාසයෙන් ලේ ගලන විට කළයුතු ප්‍රථමාධාරය වනුයේ,
 - I. හිස පිටුපසට නැමුරු කර නාසය තද කර, කටින් හුස්ම ගැනීමට සැලැස්වීම.
 - II. නාසය තද කර, හිස මදක් ඉදිරියට නමා පුටුවක වාඩි කරන්න. කටින් ශ්වසනය කිරීමට සලස්වන්න.
 - III. නාසය මත අයිස් තබා රෝගියා බිම දිගා කරවීම.
 - IV. ඉහත සඳහන් සියල්ලම වැරදියි.
24. බල්ලෙකු සපා කෑ විට ප්‍රථමයෙන් සිදු කළ යුත්තේ,
 - I. වේදනාව අඩු කිරීමට ඇස්ප්‍රින් පෙත්තක් ලබාදීම.
 - II. ලේ ගැලීම නැවැත්වීම සඳහා තදින් රෙදි පටියකින් වෙලීම.
 - III. අපාල ස්ථානය සබන් ගා හොඳින් සෝදා, අනතුරුව ලේ ගැලීම පාලනය කිරීමට පිරිසිදු රෙදි පටියකින් ලිහිල් ලෙස වෙලීම.
 - IV. ඉහත සඳහන් කිසිවක් නොකර, හැකි පමණ ඉක්මනින් රෝහල් ගත කිරීම.
25. පහත සඳහන් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරා ගන්න.
 - I. බල්ලෙකු සපා කෑ විට සබන් ආලේප නොකළ යුතුයි.
 - II. ක්ලාන්තය ඇති රෝගියෙකු සුවවීමේ ඉරියව්වට (Recovery Position) පත්කළ යුතුයි.
 - III. උගුරේ යමක් හිරවී ඇති පුද්ගලයෙකුට බිමට වතුර ලබා දීම.
 - IV. ලේ ගැලීමක් පාලනය කරන ප්‍රධානතම ක්‍රමය කෙළින් පිඩනයක් යොදවයි. (මේ සඳහා පිරිසිදු රෙදි කඩක් සැරහුමක් ලෙස භාවිතා කරයි.)
26. ඔබගේ මවගේ කකුළු ඇය ගෙදර වැඩ කරමින් සිටින අතර උළුක්කු වී ඇත. කකුළු අල්ලාගෙන වේදනාවෙන් සිටියි. ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?
 - I. වහාම සිද්ධාලේප හෝ වෙනයම් ආලේපනයක් ගෑම.
 - II. ආබාධිත ස්ථානය විවේකිව තබා එම ස්ථානයට අයිස් තබා වෙලුම් පටියක් දමා උඩට ඔසවා තැබීම.
 - III. වහාම ඇයව රෝහලකට ගෙන යාමට කටයුතු කිරීම.
 - IV. ඇයව වාඩිකර තබා, වහාම බිමට යමක් ලබාදීම.
27. කුඩා ළදරුවෙකුට (මාස 12ට අඩු) පපු තෙරපුම දෙනු ලබන්නේ,

I. එක අතකින් පමණි	II. අත් දෙකින්ම
III. එක ඇතිල්ලකින් පමණි	IV. ඇතිලි දෙකකින්
28. ලේ ගලන තුවාලයකට පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලකින් පිඩනයක් යොදන්නේ,
 - I. වේදනාව නැවැත්වීමට
 - II. ලේ ගැලීම සම්බන්ධව තුවාලකරුගේ අවධානය වෙත අතකට යොමු කිරීම හා ක්ලාන්තය දැමීමෙන් වැළැක්වීමට.
 - III. ලේ ගැලීම අඩු කර ලේ කැටි ගැසීම සඳහා
 - IV. විෂබීජ ඇතුළුවීම වැළැක්වීමට
29. යම් අයෙකු විසඳෙනාවයට පත් වී ඇත. ඔහුට නිරික්ෂණය කිරීමේදී හුස්ම ගැනීම සහ හෘද ස්පන්දනය විධිමත්ව පවතී. අපාල ප්‍රථමාධාරය වන්නේ,

I. වහාම CPR ලබාදීම.	II. ආරක්ෂිත ඉරියව්වේ (Recovery Position) තැබීම.
III. හිසට අයිස් තැබීම.	IV. බිම දිගාකර දෙපා ඔසවා තැබීම.